

Your baby's hearing screening shows that more testing is needed. Many babies who don't pass the screening are found to have normal hearing. Yet, some babies are born with a permanent hearing loss. It is important that a special diagnostic hearing test be done by an audiologist who is trained to work with babies.



How to follow-up after not passing newborn hearing screening:

1. Call your baby's doctor for a referral and help getting a follow-up hearing test with an audiologist who works with babies and has the special equipment.
 - Talk to your baby's doctor about the option of testing for Cytomegalovirus (CMV) **prior to 21 days of age**.
2. And/or call your insurance company and tell them that your baby needs a "diagnostic hearing test". Ask what you need to do to get the test paid for by insurance.
3. If you need help locating an audiologist near you: Call University of Illinois at Chicago - Specialized Care for Children at: (800) 322-3722 or log onto www.ehdi-pals.org for a national listing of pediatric audiologists.
4. Call the pediatric audiologist and make an appointment.
5. At the appointment with the pediatric audiologist:
 - Confirm the audiologist takes your insurance, medical card and/or Specialized Care for Children.
 - Have the audiologist send the test results to your baby's doctor and to the Illinois Department of Public Health.

Pregnant women who contract CMV can pass the virus to their unborn baby, which can result in multiple disabilities including: hearing loss, vision loss, poor brain growth, cerebral palsy, epilepsy, and in rare cases, fetal death. If your infant did not pass the newborn hearing screening in the hospital, discuss the options for testing for CMV prior to 21 days of life.

(Abierto para Español)

Babies are tested for hearing loss at birth. Knowing how much a baby can hear as early in life as possible means your child will not miss out on communication and important learning experiences.



The sooner you start, the further they get.

Professionals who may work with your baby:

Pediatric Audiologist:

health care provider who has special training and equipment for testing babies.

Otolaryngologist or Otologist:

medical doctor who specializes in the problems of the ear, nose and throat and is sometimes called an ENT doctor.



Next Steps for Newborn Hearing Screening Follow-up

Sigüientes Pasos para el Seguimiento de Prueba de Audición para Recién Nacidos



Program Goals:

- Screen hearing no later than 1 month
- Identify a hearing loss no later than 3 months
- Connect to intervention and services no later than 6 months

If your baby did not pass the newborn hearing screening, a follow-up hearing test is the only way to find out if there is a hearing loss.

Si su bebé no pasó la prueba de audición del recién nacido, una prueba de audición de seguimiento es la única manera de averiguar si hay una pérdida de audición.

For Information (Para Información)

Referrals and Resources (Referencias y Recursos)



dsc.c.uic.edu

1-800-322-3722 (Voice/Voz)

Hospital Screening (Pruebas de detección en el Hospital)

Illinois Department of Public Health
(IDPH)

1-217-782-4733 (Voice/Voz)

1-800-547-0466 (TTY)

Early Intervention (Intervención Temprana)

Illinois Department of Human
Services - Early Intervention

You may call the automated helpline at:
(Puede llamar a la línea automática de ayuda)

1-800-323-4769 (Voice/Voz)

1-800-447-6404 (TTY)

www.dhs.state.il.us/EI

This publication was supported in part by the Department of Health & Human Services under Award No. 1 H61MC04498-09-02 and its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the Department of Health & Human Services.

Esta publicación fue auspiciada en parte por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la Concesión (Premio) No. 1 H61MC04498-09-02 y su contenido es responsabilidad única de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista (la opinión) del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Los bebés son examinados de la pérdida de audición en el nacimiento. Sabiendo lo antes posible en la vida cuánto un bebé puede oír significa que su hijo no va a perder la oportunidad de comunicación y experiencias de aprendizaje importantes.



Cuanto antes comience, cuanto más ellos reciben.

Los profesionales que pueden trabajar con su bebé:

Audiólogo Pediátrico:

médico con capacitación especial y equipo para examinar a los bebés.

El Otorrinolaringólogo u Otólogo:

un médico que se especializa en los problemas del oído, nariz y garganta y, a veces se le llama médico de ORL (otorrinolaringólogo).

La evaluación de audición de su bebé muestra que es necesario realizar más pruebas. Se encuentra que muchos bebés que no pasan el examen tienen una audición normal. Sin embargo, algunos bebés nacen con una pérdida de audición permanente. Es importante que una prueba especial de diagnóstico de audición se realice por un audiólogo que está capacitado para trabajar con bebés.



Cómo Dar Seguimiento Después de no Pasar la Prueba de Audición Neonatal:

1. Llame al médico de su bebé para un referido y ayuda para obtener una prueba de audición de seguimiento con un audiólogo que trabaja con bebés y tiene el equipo especial.
 - Hable con el médico de su bebé acerca de la opción de prueba de citomegalovirus (CMV) **antes de los 21 días de edad.**
2. Y/o llame a su compañía de seguros y dígalos que su bebé necesita una “prueba de audición de diagnóstico”. Pregunte lo que tiene que hacer para conseguir la prueba pagada por el seguro.
3. Si usted necesita ayuda para localizar un audiólogo cerca de usted: Llame a la Universidad de Illinois en Chicago – Cuidado Especializado para Niños al: (800) 322-3722 o ingrese a www.ehdi-pals.org para una lista nacional de audiólogos pediátricos.
4. Llame al audiólogo pediátrico y haga una cita.
5. En la cita con el audiólogo pediátrico:
 - Confirme si el audiólogo acepta su seguro, tarjeta médica y / o Cuidado Especializado para Niños.
 - Haga que el audiólogo envíe los resultados de las pruebas al médico de su bebé y al Departamento de Salud Pública de Illinois.

Las mujeres embarazadas que contraen CMV pueden transmitir el virus a su bebé antes de nacer, lo que puede dar lugar a múltiples discapacidades incluyendo: pérdida de la audición, pérdida de la visión, crecimiento cerebral pobre, parálisis cerebral, epilepsia y en casos raros, la muerte fetal. Si su bebé no pasó la prueba de audición del recién nacido en el hospital, hable sobre las opciones para la prueba de CMV antes de los 21 días de vida.

(Open for English)